


FLUXOGRAMA PEP


Profilaxia Pós-Exposição de Risco ao HIV para os Serviços de Urgência/Emergência (UPA's e Hospitais)

Unidade do Primeiro Atendimento



*PEP poderá ser indicada quando pessoa fonte teve exposição de risco nos últimos 30 dias, devido janela imunológica.

QUANDO HOUVER INDICAÇÃO DE PEP



SEMPRE atentar para o tempo transcorrido entre a exposição e início da tomada das medicações; em caso de dúvida, prescrever e dispensar a medicação antes de liberar o paciente

Notificação original deverá ser encaminhada ao DVE.

Esquema de Medicções - Adulto

ESQUEMA PREFERENCIAL

(TDF + 3TC) + DTG

Tenofovir 300mg (TDF) + Lamivudina 300mg (3TC) (comprimido combinado) + Dolutegravir 50mg (DTG)

1 comprimido de cada, 1x ao dia por 28 dias. (Início imediato).

Crianças abaixo de 12 anos deverão ser encaminhadas ao Hospital Pequeno Anjo.

FORMULÁRIOS PARA PRESCRIÇÃO DISPONÍVEIS NO QR CODE AO LADO



Fonte: Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia pós-exposição de risco à infecção pelo HIV, IST e hepatites virais. Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: www.ceredi.org.br
 Nota Informativa nº 1/2022 – CGAHV/DCCI/SVS/MS Dispõe sobre recomendações do uso de dolutegravir em gestantes independente da idade gestacional e mulheres vivendo com HIV em idade fértil, com intenção de engravidar.

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
Setor IST/AIDS/HIV	Setor IST/AIDS/HIV e CEREDI	Setor IST/AIDS/HIV Diretoria da Vigilância Epidemiológica